

**سرفه** مفید و استفاده از وسایل تنفسی مانند **اسپیرومتر** که در اختیار شما قرار داده می شود و جهت افزایش ظرفیت تنفسی ریه هاست.

توجه شود که بعد از هر جراحی بزرگ ترشحات در ریه ها جمع شده و در صورت عدم خروج، عفونتهای تنفسی و سایر مشکلات تنفسی بوجود می آید. بنابراین همکاری شما در انجام تمرین تنفسی و انجام فعالیتهای فیزیکی مانند **راه رفتن** بسیار ضروری است.

## ۲- **فعالیت فیزیکی و ورزش:** بیمار در

صورت اجازه پزشک معالج باشست روزانه ۲ تا ۳ بار و در هر بار در حدود ۱۰ دقیقه قدم بزنده و روزانه به میزان راه رفتن خود بیافزاید.

توجه: تا مدت ۳ ماه بعد از عمل جراحی از برداشتن جسم سنگین و انجام رانندگی خودداری شود این زمان جهت جوش خوردن و ترمیم کامل استخوان جناغ سینه لازم است. پس از

- **بی اشتهاي:** توصیه می شود به مصرف مواد غذایي مطبوع و مورد نظرتان بپردازید.

- **اختلالات خواب:** سعی شود هواي اتاق مناسب و دارای تهویه مطبوع باشد در روز زياد چرت نزنيد، ساعت مشخصی برای خواب خود داشته باشید.

- **بيوست:** توصیه می شود به مصرف مایعات، سبزیجات و میوه ها بپردازید. می توانيد از آب آلو استفاده کنید.

- **خستگی و افسردگی:** استراحت و آرامش، تحرک و ملاقات کوتاه با نزدیکان در روند بهبودی شما مuther میباشد.

- این موارد معمولاً تا یکماه پس از انجام عمل جراحی قلب در نزد برخی از بیماران ایجاد می شود و در سنین بالاتر شدت می یابد. در صورت تشدید موارد فوق با پزشک خود مشورت نمایید.

۱- یکی از مهمترین موارد مراقبتی پس از عمل جراحی قلب **فيزيوتراپي تنفسی** است که شامل **تمرینات تنفسی، آموزش**



## توصیه های لازم پس از عمل جراحی ناجاریهای مادرزادی قلب

ضمن آزوی سلامتی کامل برای کلیه بیماران، مذکور می شود که جراحی قلب یکی از مهمترین اعمال جراحی است. توجه شود که انجام مراقبتهاي صحیح توسط بیماران پس از عمل جراحی قلب می تواند ضامن سلامت کامل فود بیماران بوده و شرایط روحی و روانی افراد فانواده را که متأثر از شرایط فرد بیمار می باشد ببرطرف کرده و فرد را به زندگی عادی فود برمی گرداند.

باید توجه داشته باشید که ممکن است پس از اعمال جراحی قلب برای مدت کوتاهی با مشکلات زیر (وبرو شوید:

## توصیه های لازم پس از عمل جراحی

### ناهنجاریهای مادرزادی قلب



### مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)

بخش جراحی قلب



۵- پس از ترخیص از بیمارستان روزانه محل زخم قفسه سینه را از نظر داشتن ترشح، قرمزی و تورم کنترل کنید. در صورتیکه ترشحات در ناحیه زخم زیاد و خصوصاً همراه با تب باشد حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.

لازم به ذکر است که زخم قفسه سینه تا ۲ الی ۳ ماه ممکن است

دردهای گوناگونی در اطراف زخم خصوصاً در



هنگام سرفه و عطسه ایجاد کند که ضمن حذف

نگرانی و اضطراب می توانید زیر نظر پزشک خود

ازمسکن ساده مانند استامینوفن کدئین استفاده نمائید.

با آرزوی سلامتی و شادابی

بخش جراحی قلب مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم

۳ ماه از برداشتن اجسام سنگین نیز خودداری گردد. فعالیت های جنسی به تدریج از ماه سوم بعد از عمل بلامانع است.

۳- **استحمام:** بعد از ترخیص از بیمارستان در صورت صلاحديد

پزشک معالج خود و در صورت سالم بودن محل عمل جراحی می توانيد استحمام کنید.



توجه: هنگام حمام کردن از آب خیلی داغ استفاده نکنید. زیرا موجب ضعف، سرگیجه و تنگی نفس می شود و سعی شود در کمترین زمان ممکن استحمام کنید. بهتر است جهت استحمام کردن از همراه کمک گرفته شود.

### ۴- رژیم غذایی مناسب



برای بیماران یک رژیم

غذایی کم نمک میباشد

