



دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
مرکز پزشکی قائم (عج)  
کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی

## دستورالعمل های مربوط به استفاده از ماسک جراحی

- به هنگام ورود به اتاق عمل اگر قرار است عمل جراحی شروع شود یا اگر عمل جراحی در حال انجام است یا اگر پگ های وسایل جراحی استریل، باز شده باشند بایستی از ماسک جراحی (high- efficiency mask) استفاده گردد تا بینی و دهان پوشیده شود.
- در تمام طول مدت جراحی، بایستی از ماسک استفاده شود.
- هر فردی که در زمان انجام عمل جراحی وارد اتاق عمل می شود باید ناحیه دهان و بینی خود را با ماسک به طور کامل بپوشاند.
- اگر در حین عمل، ماسک آلوده یا خیس (مرطوب) شود، باید تعویض گردد.
- استفاده از ماسک ضخیم یک لایه از جنس پارچه یا فرم Laminated fabric کافی است. ماسک های پارچه ای نخی که قابل استفاده مجدد می باشند، به اندازه ماسک هایی که از مواد مصنوعی ساخته شده اند (synthetic fabric) کارایی دارند.
- ماسک جراحی را نباید از گردن آویزان نمود و یا در جیب گذاشت و دوباره استفاده نمود.
- در موارد احتمال بیماری سل بایستی از ماسک های با کارایی بالا استفاده گردد