

کد سند: QH-pa1517



مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی قائم (ع)  
واحد آموزش به بیمار و خانواده

## داروهای قلبی عروقی کلورپیا



ویژه بیمار و خانواده

تاریخ ویرایش: اردیبهشت ۱۴۰۴  
تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۷  
کد بازنگری: ۰۰۲



کلینیک پرستاری آموزش سلامت واقع در درمانگاه مرکزی  
بیمارستان قائم (عج) اتاق ۳ با کادری مجرب همه روزهای کاری  
هفته از ساعت ۹ تا ۱۲ بصورت رایگان آماده پاسخگویی به سوالات  
شما می باشد.



### مددجو و همراه گرامی

با شناسه پیگیری که در خلاصه پرونده یا برگه آزمایش  
است می توانید کلیه آزمایشات معوقه را از طریق آدرس  
زیر پیگیری کنید.

<https://labresult.mums.ac.ir/>

منبع:

1. <https://medlineplus>.
2. <https://www.clinicalkey>.



Cardiology

- این دارو را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف کنید.
- پزشک ممکن است همزمان با این دارو، سایر داروهای ضد دیابت را تجویز کند؛ لذا در چنین شرایطی افت قند خون می تواند اتفاق بیفتد.
- در شرایط استرس مانند تب، ضربه (مانند تصادف با ماشین)، عفونت و یا جراحی، ممکن است مقدار مصرف دارو تغییر یابد.
- هنگام مصرف این دارو، رژیم غذایی و تمرینات ورزشی توصیه شده توسط پزشک را رعایت نمایید.
- هنگام مصرف این دارو، ممکن است در ادرار قند مشاهده گردد.
- در مورد مصرف بیشتر مایعات با پزشک خود مشورت نمایید.
- جهت اثربخشی بیشتر و همچنین به خاطر سپردن مصرف روزانه، این دارو را هر روز در یک زمان مشخص میل نمایید.



ممدجوی گرامی این برگه آموزشی، حاوی نکاتی جهت افزایش آگاهی شما در رابطه با داروی مصرفی شما می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده، هرچه سریعتر سلامت خود را بازیابید.



### کلوریا یا امپاگلیفلوزین چیست؟

داروی خوراکی کاهنده قند خون که در دیابت نوع ۲ برای کنترل قندخون و کاهش خطر مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت استفاده می شود.



### داروی کلوریا چه زمانی و چگونه مصرف شود؟

دارو را یک بار در روز در هنگام صبح، همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف نمایید.

### در صورت فراموش کردن یک نوبت دارو یا مصرف بیشتر چکار کنیم؟

در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

### کلوریا با چه داروهایی تداخل دارد؟

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می کنید، پزشک خود را مطلع سازید:

- انسولین و سایر داروهای کاهنده قند خون
- پگوسومات، سوماتروپین
- کورتیکواستروئیدها
- دلوکستین، لوودوپا
- داروهای کاهنده فشار خون
- داروهای ادرارآور تیازیدی
- آندروژن ها نظیر دانازول

### هنگام مصرف داروی کلوریا چه مراقبتها و توجهاتی لازم است؟

این دارو ممکن است سبب گیجی، منگی یا سنکوپ در برخی افراد شود. احتمال بروز این اثرات بخصوص در مصرف همزمان با الکل یا برخی داروها آب و هوای بسیار گرم، ورزش یا تب ممکن است افزایش یابد. لذا ضمن درمان، از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نموده و به منظور جلوگیری از این اثرات، نشستن یا ایستادن را به آرامی انجام دهید، بخصوص اگر در هنگام صبح باشد.

همیشه کارت شناسایی خود را که نشان دهنده

ابتلای شما به بیماری دیابت است، به همراه داشته باشید.

برنامه رژیم غذایی و تمرینات ورزشی تجویز شده توسط پزشک را رعایت کنید. رژیم غذایی صحیح، تمرینات ورزشی منظم و آزمایش مرتب قند خون در اثربخشی این دارو دارای نقش موثری می باشد.

کنترل میزان قند خون در شرایط استرس مانند تب، عفونت، جراحی یا جراحی ممکن است دشوارتر باشد. در چنین شرایطی با پزشک خود مشورت نموده، بدون تجویز وی از تغییر مقدار مصرف دارو خودداری کنید.

هنگام مصرف این دارو، بخصوص در هوای گرم و یا فعالیت بدنی، مراقب از دست دادن آب بدن خود باشید. از دست دادن آب بدن ممکن است باعث افزایش احتمال عوارض جانبی دارو گردد.

در صورت استفراغ یا اسهال، به منظور جلوگیری از کاهش آب بدن، با پزشک خود تماس بگیرید.

قبل از انجام هرگونه مراقبتهای پزشکی یا دندانپزشکی، فوریت های پزشکی و یا جراحی، پزشک یا دندانپزشک خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.