


مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی قائم (ع)
واحد آموزش بیمار و خانواده

درباره جراحی بنتال قلب و مراقبت آن بیشتر بدانیم...



ویژه بیمار و خانواده

تاریخ ویرایش: آبان ۱۴۰۳
تاریخ بازنگری: آبان ۱۴۰۶
کد بازنگری: ۰۰۱



کلینیک پرستاری آموزش سلامت واقع در درمانگاه مرکزی
بیمارستان قائم (عج) اتاق ۳ با کادری مجرب روزهای غیر تعطیل
هفته از ساعت ۹ تا ۱۲ به صورت رایگان آماده پاسخگویی به سوالات
شما می‌باشد.



مددجو و همراه گرامی

با شناسه پیگیری که در خلاصه پرونده یا برگه آزمایش
است می‌توانید کلیه آزمایشات معوقه را از طریق آدرس
زیر پیگیری کنید.

<https://labresult.mums.ac.ir/>

منبع:

1. <https://medlineplus.>
2. <https://www.clinicalkey.com>



Cardiology

- برخی افراد در چند روز اول ممکن است که تعریق یا احساس سرما و یا تب مختصر داشته باشند که طبیعی است.

اقدامات موثر در بهبود بیمار پس از ترخیص:

- با انجام فیزیوتراپی میزان تحرک خود را بهبود بخشید.
- بهبود قفسه سینه ۶ تا ۸ هفته زمان می‌برد، در این مدت از انجام حرکات چرخشی و خطرناک اجتناب کنید.
- تمرینات تنفسی که به شما آموزش داده شده را انجام دهید.
- در چند هفته اول بعد از ترخیص حتماً یک نفر باید به شما در انجام کارها کمک نماید.
- برای بهبود سریعتر توصیه می‌شود در یک مرکز توان بخشی قلب ثبت نام نمایید.
- بعد از ترخیص حتماً جهت ویزیت مجدد به پزشک معالج مراجعه نمایید.
- داروهای خود را تا پایان و به صورت دقیق مصرف نمایید.
- توصیه‌های پرستاران در مورد مراقبت از زخم را رعایت فرمایید.

مددجوی گرامی این برگه آموزشی، حاوی نکاتی جهت افزایش آگاهی شما در رابطه با **جراحی بنتال قلب** می باشد. امیدواریم با رعایت این نکات، هر چه سریعتر سلامت خود را بازیابید.



عمل جراحی بنتال قلب چیست؟

بنتال یکی از عمل های جراحی پیچیده قلبی است که در آن دریچه آئورت قلب و ریشه آئورت و شریان آئورت صعودی با هم تعویض می شوند.

در این عمل جراحی، هر سه قسمت با استفاده از یک رگ مصنوعی که به انتهای آن دریچه مصنوعی فلزی یا بیولوژیک متصل شده است، تعویض می شوند.

این عمل تحت بی هوشی عمومی انجام می شود و تقریباً ۵ ساعت طول می کشد. بعد از عمل بیمار به بخش مراقبت های ویژه یا ICU منتقل می شود.

جراحی بنتال در چه مواردی انجام می شود؟

- عفونت و آندوکاردیت
- در تروما و ضربات شدید
- فشار خون بالا و بیماری های آئورت
- واسکولیت
- رگورژیتاسیون یا پس زنی آئورت
- سندرم مارفان
- آنوریسم آئورتی
- دایسکسیون آئورت

عوارض جراحی بنتال قلب چیست؟

- خونریزی
- ضربان غیر عادی قلب (آریتمی)
- مشکل در حافظه کوتاه مدت و تمرکز
- تاری دید
- عفونت
- مشکلات ریوی و قلبی
- سکنه مغزی
- ایجاد لخته خون در پاها یا ریه
- مرگ



آموزش های قبل از عمل جراحی:

- آزمایشات خون، عکس قفسه سینه و نوار قلب و سونوگرافی داپلر رگ های گردن طبق دستور پزشک باید انجام شود.
- بیمار باید با یک صابون ضد باکتری حمام نماید.
- موهای قفسه سینه، بازوها، پاها، کشاله ران توسط کادر بیمارستان تراشیده می شود.
- از شب قبل عمل باید ناشتا شود.
- روز قبل از عمل حتما باید اجابت مزاج داشته باشد.

آموزش های بعد از عمل جراحی:

- در روز اول بعد از عمل فرد با کمک از تخت پایین آمده و بر روی صندلی می نشیند و در صورت نداشتن مشکل چند قدم راه می رود.
- جهت مراقبت از زخم، پانسمان شما توسط پرستار تعویض خواهد شد.
- لوله هایی به قفسه سینه بیمار وصل است تا مایعات قفسه سینه خارج شود.
- با نوشیدن مایعات و میوه و سبزیجات از یبوست پیشگیری نمایید.
- ممکن است احساس فشار و درد در قفسه سینه یا شانه های خود داشته باشید که به شما مسکن داده خواهد شد.
- تپش قلب تا ۴ هفته بعد از عمل طبیعی است.
- تا ۶ هفته از خوابیدن بر روی شکم خودداری شود.
- برخی افراد ممکن است که نقاط نورانی را در جلوی دید خود مشاهده نمایند که با گذشت زمان بهبود می یابد.
- کم اشتها و احساس تغییر در مزه ها تا ۳ ماه بعد از عمل ممکن است وجود داشته باشد. بیمار باید غذاهای ساده، سرد و کم حجم مصرف کند و از مصرف غذاهای تند و پر ادویه پرهیز کند.