




مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی قائم (ع)  
واحد آموزش به بیمار و خانواده

## درباره دایسکشن آئورت و مراقبت‌های آن بیشتر بدانیم...



ویژه بیمار و خانواده

تاریخ ویرایش: شهریور ۱۴۰۳

تاریخ بازنگری: شهریور ۱۴۰۶

کد بازنگری: ۰۰۱



کلینیک پرستاری آموزش سلامت واقع در درمانگاه مرکزی  
بیمارستان قائم (عج) اتاق ۳ با کادری مجرب همه روزهای کاری  
هفته از ساعت ۹ تا ۱۲ بصورت رایگان آماده پاسخگویی به سوالات  
شما می باشد.



### مددجو و همراه گرامی

با شناسه پیگیری که در خلاصه پرونده یا برگه آزمایش  
است می‌توانید کلیه آزمایشات معوقه را از طریق آدرس  
زیر پیگیری کنید.

<https://labresult.mums.ac.ir/>

منبع:

1. <https://medlineplus>.
2. <https://www.clinicalkey>



- داروهای تجویز شده توسط پزشک، خصوصا  
داروهای کاهنده فشار خون را به موقع مصرف  
کنید.



- سیگار نکشید.

- در تاریخ تعیین شده جهت ویزیت به پزشک  
معالج خود مراجعه نمایید.

- از انجام فعالیت شدید بدنی و ورزش شدید  
خودداری نمایید.



- زخم خود را روزانه از نظر علائم عفونت بررسی  
نمایید.


ممدجوی گرامی این برگه آموزشی، حاوی نکاتی جهت افزایش آگاهی شما در رابطه با مراقبت‌های بیماری دایسکشن آئورت می‌باشد. امیدواریم با رعایت این نکات، هر چه سریعتر سلامت خود را بازیابید.



### دایسکشن آئورت چیست؟

به پارگی در دیواره آئورت (شریان اصلی قلب)، دایسکشن آئورت می‌گویند. وظیفه‌ی آئورت ارسال خون از قلب به بقیه بدن است. بروز پارگی در آئورت باعث می‌شود که خون به لایه‌ی سوم آئورت وارد شود. این مسئله باعث کاهش میزان ارسال اکسیژن و مواد مغذی لازم برای اعضای بدن شما می‌شود.

با گذشت زمان، پارگی به وجود آمده می‌تواند بر عملکرد مغز، ریه‌ها، بازوها، پاها و قلب شما تاثیر بگذارد. بروز این عوارض بستگی به جایی دارد که آئورت شما دچار پارگی شده است.



### عوامل خطر ایجاد کننده دایسکشن آئورت:

- فشار خون بالا
- صدمات ناشی از حوادث و یا تصادف
- علل ژنتیکی
- مشکلات ساختاری قلب
- استعمال سیگار

### درمان دایسکشن آئورت:

- عمل جراحی قلب باز
- جراحی اندو واسکولار (حالت تهاجمی کمتری دارد)

نحوه‌ی درمان این عارضه، بستگی به جایی دارد که پارگی در آن ایجاد شده است. اگر پارگی در آئورت صعودی (بالارو) باشد، به احتمال زیاد به عمل جراحی احتیاج خواهید داشت.

اگر دایسکشن آئورت در آئورت بالارو قرار داشته باشد، ممکن است زندگی فرد را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد. آئورت بالارو بخشی از آئورت است که از قفسه‌ی سینه به سمت سر بالا می‌رود. جراح باید دایسکشن ایجاد شده در آئورت بالا رو را در اسرع وقت ترمیم کند.

اگر بیمار تحمل عمل قلب باز را نداشته باشد و دایسکشن در آئورت پایین رو باشد، ممکن است از روش جراحی آندوواسکولار استفاده شود.

آئورت پایین رو بخشی از آئورت است که از قفسه سینه و شکم به سمت پایین می‌رود.

### خطرات عمل جراحی ترمیم دایسکشن آئورت چیست؟

- سکته یا حمله قلبی
- عفونت ریه
- خون ریزی داخلی
- عوارض بی‌هوشی
- مرگ



- در روزهای اول بعد از ترخیص حتما یک نفر برای کمک به شما باید در منزل حضور داشته باشد.
- تا ۳ ماه بعد از جراحی بیشتر استراحت کنید.
- تغذیه صحیح شامل مواد غذایی حاوی کالری و ویتامین داشته باشید تا انرژی خود را به دست آورید.

