

کد سند: QH-pa1516



مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی قائم (ع)
واحد آموزش بیمار و خانواده

داروهای قلبی عروقی

رانولازین



ویژه بیمار و خانواده

تاریخ ویرایش: اردیبهشت ۱۴۰۴

تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۷

کد بازنگری: ۰۰۲



کلینیک پرستاری آموزش سلامت واقع در درمانگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج) اتاق ۴ با کادری مجرب همه روزهای هفته از ساعت ۹ تا ۱۲ بصورت رایگان آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشد.



مددجو و همراه گرامی

با شناسه پیگیری که در خلاصه پرونده یا برگه آزمایش است می توانید کلیه آزمایشات معوقه را از طریق آدرس زیر پیگیری کنید.

<https://labresult.mums.ac.ir/>

منبع:

1. <https://medlineplus>
2. <https://www.clinicalkey>



Cardiology

- قبل از مصرف الکل، با پزشک خود صحبت کنید.
- در صورت بارداری یا قصد بارداری، به پزشک خود بگویید.
- اگر شیردهی دارید، به پزشک خود بگویید.
- دارو را همراه با غذا یا بعد از غذا مصرف کنید.
- حتی با وجود احساس بهبودی مصرف دارو را ادامه دهید.
- برای به دست آوردن بیشترین اثر، هیچ دوزی را از دست ندهید.
- دارو را به طور کامل ببلعید؛ از خردکردن آن با دندان خودداری کنید.

علائم و نشانه های خطر با مصرف داروی رانولازین کدام است؟

- در صورت بروز هر یک از عوارض زیر در اسرع وقت با پزشک معالج مشورت نمایید:
- ✂ سردرد، سرگیجه، سبکی سر
 - ✂ خستگی
 - ✂ تهوع و یبوست
 - ✂ لرزش، بیحسی
 - ✂ تغییرات بینایی
 - ✂ افزایش وزن غیرطبیعی، تورم پا یا مچ پا
 - ✂ علائم مشکلات کلیوی (مانند تغییر در میزان ادرار)

مُدِجَوی گرامی این برِگه آموزشی، حاوی نکاتی جهت افزایش آگاهی شما در رابطه با داروی رانولازین و مراقبتهای آن می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده، هر چه سریعتر سلامت خود را بازیابید.



داروی رانولازین چیست؟

رانولازین یک داروی نسبتاً جدید است که خوشبختانه در کشور ما نیز اخیراً در دسترس قرار گرفته است. این دارو برای کاهش دردهای سینه حین فعالیت ناشی از تنگی عروق قلب استفاده می شود.

رانولازین اثرات ضد آنژین و ضد ایسکمی بدون تغییر در پارامترهای همودینامیک (ضربان قلب یا فشارخون) ایجاد می کند.



رانولازین با کدام داروها تداخل دارد؟

- داروهای درمان تشنج مانند کاربامازپین، فنوباریتال، فنی توئین
- آنتی بیوتیکهایی نظیر ریفامپین، ریفامپین

- داروهای درمان HIV مانند نلفیناویر، ریتوناویر
- داروهای ضد قارچ مانند ایتراکونازول، کتوکنازول
- آمیودارون، پیموزاید، دوفتیلید، پروکائین آمید، کینیدین
- سوتالول، کوبیسسیستات، نفازودون، مخمر سنت جان

در صورت فراموش کردن یک نوبت دارو یا مصرف بیشتر چکار کنیم؟

- این دارو را به طور منظم و در ساعات مشخصی از روز مصرف نمایید.
- در صورت فراموش کردن یک دوز رانولازین، از مصرف نوبت فراموش شده اجتناب کنید و برطبق برنامه مشخص به مصرف دارو ادامه دهید.
- هیچگاه دوز دارو را دو برابر نکنید.

موارد منع مصرف داروی رانولازین کدام است؟

- حساسیت به این دارو یا دیگر داروها و مواد
- بارداری و شیردهی
- مشکلات قلبی خاص (نارسایی قلبی، ضربان قلب کند)
- مشکلات کبدی (مانند سیروز)
- مشکلات کلیوی
- سابقه سرطانهای بدخیم

- سابقه پولیپهای آدنومایی
- سطوح پایین پتاسیم یا منیزیم در خون
- تعریق شدید، اسهال یا استفراغ
- استفاده از داروهای خاص مانند دیورتیکها یا قرصهای ادرارآور

هنگام مصرف داروی رانولازین چه راقبتها و توجهاتی لازم است؟

- اجتناب از رانندگی و انجام اقدامات دیگری که نیاز به هوشیاری دارد تا زمانی که متوجه شوید که چگونه رانولازین بر شما تاثیر می گذارد.
- برای کاهش احتمال سرگیجه و زمین افتادن هنگام برخاستن آهسته بلند شوید؛ هنگام بالا و پایین رفتن از پله ها احتیاط کنید.
- فشار خون و ضربان قلب خود را، بررسی کنید.
- اگر آب گریپ فروت میخورید یا گریپ فروت زیاد مصرف می کنید، با پزشک خود صحبت کنید.
- برای درمان درد ناگهانی قفسه سینه از رانولازین استفاده نکنید. این کمک نخواهد کرد. با دکتر خود صحبت کنید.
- نارسایی کلیه در افرادی که دچار مشکلات کلیوی بوده اند با رانولازین اتفاق افتاده است. با دکتر صحبت کنید.