



مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی قائم (ع)

واحد آموزش به بیمار و خانواده

درباره سقط غیر قانونی بیشتر بدانیم...



ویژه بیمار و خانواده

تاریخ ویرایش: بهمن ۱۴۰۳

تاریخ بازنگری: بهمن ۱۴۰۶

کد بازنگری: ۰۰۲



کلینیک پرستاری آموزش سلامت واقع در درمانگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج) اتاق ۴ با کادری مجرب همه روزهای هفته از ساعت ۹ تا ۱۲ بصورت رایگان آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشد.



مددجو و همراه گرامی

با شناسه پیگیری که در خلاصه پرونده یا برگه آزمایش است می توانید کلیه آزمایشات معوقه را از طریق آدرس زیر پیگیری کنید.

<https://labresult.mums.ac.ir/>

منبع:

1. <https://medlineplus>.

۲- بارداری و زایمان ویلیامز، ویراست بیست و چهارم، ترجمه مهرناز ولدان، انتشارات ارجمند، ۱۳۹۳



روشهای غیر قانونی سقط ممکن است به صورت دارویی یا استفاده از ابزار باشد:

✧ استفاده از دارو ممکن است سبب مسمومیت و بروز علائمی همچون تب بالا، لرز، درد شکم، استفراغ، اسهال، لرزش، بیقراری، گیجی، هیپوکسمی و افت فشار خون شود.

✧ استفاده از ابزار ممکن است سبب عفونت رحمی، خونریزی غیر قابل کنترل و پارگی رحم گردد.

پیگیری از سقط جنین نایمن نیاز به یک رویکرد چندجانبه دارد:

- پیگیری از بارداری ناخواسته
- مشاوره تنظیم خانواده پس از سقط جنین و خدمات پیگیری از بارداری

توجه نمایید:

در صورت وجود هر گونه ناهنجاری در جنین یا بیماری در مادر که نیازمند سقط قانونی است، در سن بارداری زیر ۱۸ هفته به پزشکی قانونی مراجعه نمایید.



ممدجوی گرامی این برگه آموزشی، حاوی نکاتی جهت افزایش آگاهی شما در ارتباط با سقط غیرقانونی می باشد. امیدواریم نکات ذکر شده، پاسخگوی سوالات شما باشد.



سقط جنین چیست؟

سقط جنین به معنی از دست رفتن محصول حاملگی قبل از هفته ۲۰ حاملگی است. دسترسی به مراقبتهای ایمن سقط جنین جزء ضروری مراقبتهای بهداشتی مادر است. متأسفانه، بخش بزرگی از سقط جنین ها ناامن و غیرقانونی می باشد و این سقطها سهم عمده ای در بروز عوارض و مرگ و میر مادران دارند.

سقط غیر ایمن یا غیر قانونی جنین توسط افرادی که مهارتهای لازم را ندارند یا از تکنیکهای خطرناک استفاده می کنند و یا در محیطی که حداقل استانداردهای پزشکی را رعایت نمی کند؛ انجام می شود.

سقط جنین ناایمن هزینه های اقتصادی زیادی دارد، زیرا این روش معمولاً به طور ناقص انجام شده و نیاز به مداخلات بعدی در بیمارستان را ایجاد می کند.

عوارض سقط جنین غیرقانونی چیست؟

✧ نارسایی کلیه

✧ خونریزی شدید

✧ کم خونی

✧ مرگ و میر

✧ چسبندگی رحم

✧ هیستریکتومی (خارج کردن رحم)

✧ سقط عفونی (خطرناک ترین عارضه)

سقط عفونی چیست؟

- یکی از عوارض خطرناک سقط غیر قانونی است. در این موارد کیسه آب جنین سوراخ شده و میکروب عفونت را وارد رحم می شود.
- سقط عفونی تهدید کننده حیات مادر بوده و با وارد شدن عفونت به داخل خون، مرگ مادر را به همراه دارد.
- تب، ترشحات چرکی و بدبو و درد از علایم این نوع سقط می باشد.
- در مواردی که سقط توسط افراد غیر متخصص و در مکانهای غیر بهداشتی و با دستکاری رحم انجام شود، خطر سقط عفونی افزایش می یابد.

- سقط جنین با ساکشن توسط افراد غیر متخصص یکی از مواردی است که خطر عفونت رحم را افزایش می دهد.

عوامل افزایش دهنده عوارض ناشی از سقط جنین غیرقانونی کدامند؟

✧ عدم مهارت ارائه دهنده

✧ تکنیک ضعیف

✧ شرایط غیربهداشتی برای انجام عمل

✧ عدم تجهیزات مناسب

✧ استفاده از مواد سمی

✧ سلامت ضعیف مادر

✧ افزایش سن حاملگی

*** نکته:** علاوه بر عدم دسترسی به درمان پس از

سقط جنین، گاهی تهدیدهای قانونی و ترس، از مراجعه افراد به بیمارستان برای دریافت مراقبتهای مناسب جلوگیری می کند.

