




واحد آموزش به بیمار و خانواده
مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی قائم (عج)

مول (بچه خوره)




با رویکرد آموزش خود مراقبتی به مددجو و خانواده

تاریخ ویرایش: دی ۹۹

تاریخ بازنگری: دی ۱۴۰۱

کد بازنگری: ۰۰۵



تلفن تماس:

کلینیک پرستاری آموزش سلامت واقع در درمانگاه مرکزی
بیمارستان قائم (عج) اتاق ۱۴ با کادری مجرب روزهای زوج
از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ بصورت رایگان آماده پاسخگویی به
سوالات شما می باشد.



منبع:

1. <https://medlineplus.gov/ectopicpregnancy.html>

2. <https://www.clinicalkey.com>

۳- بارداری و زایمان ویلیامز، ویراست بیست و چهارم ترجمه

مهرناز ولدان انتشارات ارجمند ۱۳۹۶



چه زمانی می توان مجددا باردار شد؟

تقریباً ۶ ماه بعد از درمان و هنگام غیر قابل تشخیص شدن
هورمون بارداری و طبق نظر پزشک می توان باردار شد

- ♦ باروری مختل نمی شود
- ♦ می توان به صورت طبیعی باردار شد .

عوامل خطر مول

- سن
- سابقه حاملگی مولی
- مصرف قرصهای خوراکی جلوگیری از بارداری و مصرف طولانی
- سابقه سقط
- استعمال دخانیات
- کاهش مصرف کاروتن
- کاهش مصرف چربی حیوانی




پیگیری بعد از ترخیص:

- ◆ بلافاصله پس از ترخیص روش پیشگیری از بارداری را شروع کنید که بهترین راه قرص های پیشگیری از باردازی می باشد .
- ◆ اندازه گیری هورمون بارداری ۴۸ ساعت بعد از عمل(دوروز)و سپس یک هفته بعد و مراجعه به پزشک با جواب آزمایشات
- ◆ سپس اندازه گیری هورمون بارداری هر هفته تا زمانی که کاهش یابد و سپس هر ماه تا ۶ ماه متوالی



روش های درمانی:

اگر فرد تمایل به بارداری مجدد نداشته باشد رحم برداشته می شود.
در صورتی که فرد تمایل به بارداری مجدد داشته باشد فقط کورتاژرحم انجام می شود.



اقدامات قبل از عمل

- ◆ در صورتی که گروه خون شما منفی و گروه خون همسرتان مثبت میباشد حتما به پزشک خود جهت تزریق روگام اطلاع دهید
- ◆ اندازه گیری هورمون بارداری و هورمون های تیرویدی
- ◆ عکس قفسه سینه:معمولا قبل از عمل یک عکس قفسه سینه از شما گرفته میشود تا در صورتیکه به ریه آسیب رسیده باشد مشخص شود.
- ◆ تجویز قرص میزوپروستول::معمولا صبح روز عمل قرص **میزوپروستول** جهت شما تجویز میشود تا دهانه رحم باز شود و عمل کورتاژراحت تر صورت بگیرد

مددجوی گرامی این برکه آموزشی، حاوی نکاتی جهت افزایش آگاهی شما در ارتباط با حاملگی مولار می باشد. میدواریم، نکات ذکر شده، پاسخگوی سوالات شما باشد



بچه خوره یا حاملگی مولار چیست؟

حاملگی مولار یا بچه خوره زمانی رخ می دهد که در هنگام ترکیب تخمک زن و اسپرم مرداختلالی در تشکیل تخم به وجود بیاید که یا تبدیل به جنین نمی شود و یا به صورت ناقص رشد می کند.

در صورت عدم درمان ممکن است به بافت های دیگر آسیب بزند



علائم حاملگی مولار:

- ◆ خونریزی واژینال
- ◆ بزرگ شدن بیش از حد رحم
- ◆ افزایش غیز طبیعی میزان هورمون بارداری
- ◆ اختلال در هورمون های تیروید
- ◆ تهوع و استفراغ شدید بارداری
- ◆ **روشهای تشخیصی**
- ◆ سونوگرافی
- ◆ اندازه گیری هورمون بارداری